

IT ISN'T JUST A LITTLE RASH



Measles can be dangerous, especially for babies and young children.

MEASLES SYMPTOMS TYPICALLY INCLUDE

- High fever (may spike to more than 104° F)
- Cough
- Runny nose
- Red, watery eyes
- Rash breaks out 3-5 days after symptoms begin



Measles Can Be Serious



people who get measles will be hospitalized.

About 1 out of 5



1 out of every 1,000
people with measles
will develop brain
swelling due to infection
(encephalitis), which may
lead to brain damage.



1 to 3 out of 1,000 people with measles will die, even with the best care.

You have the power to protect your child. Provide your children with safe



and long-lasting protection against measles by making sure they get the measles-mumps-rubella (MMR) vaccine according to CDC's recommended immunization schedule.

WWW.CDC.GOV/MEASLES







Sarampión

NO ES SIMPLEMENTE UN SARPULLIDO LEVE



El sarampión puede ser peligroso, sobre todo en los bebés y niños pequeños.

LOS SÍNTOMAS DEL SARAMPIÓN INCLUYEN POR LO GENERAL LOS SIGUIENTES:

- Fiebre alta (puede subir hasta más de 104 °F)
- Tos
- Moqueo
- Ojos enrojecidos y llorosos
- Sarpullido que aparece
 3 a 5 días después de que empiezan los síntomas



El sarampión puede ser grave



cada 5 personas que contraen el sarampión será hospitalizada.

Cerca de 1 de



1 de cada 1000
personas con sarampión
presentará inflamación del
cerebro por la infección
(encefalitis), lo cual puede
causar daño cerebral.



1 o 3 de cada 1000 personas con sarampión morirán, aun cuando reciban la mejor atención.

Usted tiene el poder de proteger a su hijo.



Dele a su hijo una protección segura y duradera contra el sarampión al asegurarse de que reciba la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), según el calendario de vacunación recomendado por los CDC.

WWW.CDC.GOV/MEASLES/RESOURCES





